

BIODYNAMISKE PREPARATER

LØVETANN

BRENNESLE

VALERIANA

KAMILLE

EIK

KISEL

RYLLIK

HUMUS

LØVETANN

LØVETANN (TARAXACUM OFFICINALIS) BIDRAR TIL Å REGULERE SILISIUM- OG OKSYGENPROSESSENE I JORDA. DEN TILTREKKER SEG SILISIUM FRA JORDA.

DEN SPILLER EN SEKUNDÆR ROLLE I REGULERINGEN AV BOR, MAGNESIUM OG SELEN



BRENNESLE

BRENNESLE (URTICA DIOICA) FORBEDRER JORDSTRUKTUREN OG FRUKTBARHETEN VED Å PÅVIRKE NITROGEN- OG JERNINNHOLDET. DEN STØTTER VIRKNINGEN AV DE FØRSTE PREPARATENE OG FREMSKYNDER OMDANNELSEN AV ORGANISK MATERIALE TIL HUMUS.



KAMILLE

KAMILLE (MATICARIA RECUTITA) GJØR KOMPOSTENS SVOVELINNHOLD MER STABILT OG HOLDBART. DEN SPILLER EN SEKUNDÆR ROLLE I REGULERINGEN AV KALIUM, BOR OG MANGAN.



EIK

EIK (QUERCUS ROBUR) FREMMER FORMINGSKREFTENE, SÆRLIG NÅR DISSE TRENGS FOR Å BEKJEMPE PLANTESYKDOMMER, OG STIMULERER KALSIMUMINNHOLDET I JORDA. DEN SPILLER EN SEKUNDÆR ROLLE I REGULERINGEN AV FOSFOR.



RYLLIK

RYLLIK (ACHILLEA MILLEFOLIUM) STØTTER PLANTENES TILPASNING TIL LOKALE FORHOLD, SAMT STIMULERER OG FORBEDRER KALIUM- OG SVOVELPROSESSENE I JORDEN



VALERIANA

VALERIANAROT (VALERIANA OFFICINALIS) STØTTER JORDENS EVNE TIL Å FUNGERE RIKTIG NÅR DET GJELDER FOSFORPROSESSER OG STIMULERER DANNELSEN AV BLOMSTER OG FRUKT. DEN SPILLER OGSÅ EN SEKUNDÆR ROLLE I REGULERINGEN AV MAGNESIUM OG SELEN.



BRUKERVEILEDNING

BLANDING:

- TILSETT PREPARATET I LUNKENT VANN AV HØY KVALITET. GJERNE FRA EN LOKAL VANNKILDE OM MULIG.
- BEGYNN Å RØRE BLANDINGEN RYTMISK SLIK AT DET DANNES EN KRAFTIG VIRVEL (VORTEX) SOM STREKKER SEG HELT NED TIL BUNNEN AV BEHOLDEREN.
- NÅR VIRVELEN ER TYDELIG, BRYT DEN BRÅTT OG ENDRE RØREBEVEGELSEN (SLIK AT DET OPPSTÅR KAOS).
- FORTSETT Å SKAPE VIRVELEN, NÅ I DEN ANDRE RETNINGEN.
- GJENTA DETTE OMTRENT HVERT MINUTT. TOTAL BLANDETID: 1 TIME.

DOSERING:

HUMUS (500)

50G/2000m²

KISEL (501)

5G/2000m²

HUMUS

AKTIVERER
MIKROBAKTIVITETEN,
FREMNER DANNELSEN AV
HUMUS, FORBEDRER
JORDENS
LUFTGJENNOMTRENDELIGHET
OG VANNHOLDNING, SAMT
STØTTER ROTDANNELSEN.
PÅFØR I DRÅPER PÅ JORDEN
OM KVELDEN FØR VANNING
OM VÅREN OG HØSTEN I
FORBINDELSE MED
JORDBEARBEIDING.



KISEL

FREMNER FOTOSYNTESE OG
LYSOPPTAK, FORBEDRER
FORM, SMAK OG
HOLDBARHET, SAMT
STYRKER STRUKTUREN OG
VITALITETEN. SPRØYT TIDLIG
OM MORGENEN PÅ EN KLAR
DAG FØR FRUKTEN
BEGYNNER Å DANNE SEG.



KOMPOST- PREPARATER

- LAG FEM HULL PÅ OMTRENT 1/3 AV KOMPOSTENS HØYDE I DEN REKKEFØLGEN SOM VISES PÅ BILDET.
- LEGG ÉN KOMPOSTPREPARAT (502-506) I HVERT HULL, CA. 1 CM³.
- BRENNESLE (504) Plasseres ALLTID I DET MIDTERSTE HULLET.
- DEKK HULLENE NØYE TIL MED KOMPOSTMATERIALE.
- TIL SLUTT TILSETT VALERIANEKSTRAKT (507) FORTYNNET I VANN OG SPRAY OVER HELE KOMPOSTENS OVERFLATE.

